

INDUCTORES DE COLÁGENO + SUTURAS REABSORBIBLES POR FIN UN LIFTING SIN CICATRICES

El **Dr. Moisés Amselem** es una referencia internacional en el campo de la Medicina Estética. Cuenta con su propia clínica en Madrid, donde realiza tratamientos faciales y corporales desarrollados por él mismo, a la vez que imparte cursos de formación para médicos de todo el mundo. Charlamos con él sobre el talón de Aquiles de los tratamientos no quirúrgicos hoy en día: la flacidez facial.

El experto ha encontrado la solución en una combinación de un estimulador de colágeno a base de microesferas de Policaprolactona y las suturas de conos bidireccionales.

¿En qué consiste el protocolo que combina la estimulación de colágeno y las suturas?

Es una sinergia entre el mejor estimulador de colágeno que he encontrado, a base de Policaprolactona, para reposicionar los volúmenes perdidos, y de las suturas de Ácido Poliláctico con conos bidireccionales, que "anclan" los tejidos y generan a su vez nuevo colágeno, de forma que obtenemos un efecto lifting global y muy eficaz.

¿Se realiza en la misma sesión?

No, en primer lugar aplico el estimulador, y a partir del cuarto mes, cuando ya se ha generado nuevo colágeno, observo los resultados y valoro si hacen falta las suturas.

¿Para quién está indicado el protocolo combinado?

Para quienes tienen una flacidez moderada, entre los 30-35 años y los 65. Además de la edad, los culpables son la herencia genética (habitualmente por parte de madre), o la pérdida excesiva de peso.

¿Qué tiene la Policaprolactona que no tengan otros inductores de colágeno del mercado?

Pertenece a una nueva generación de estimuladores de colágeno formados a partir de esferas de Policaprolactona y un gel portador (Carboximetilcelulosa) que consiguen, actuando en sinergia, recuperar el

volumen de la juventud de forma natural y reposicionar las facciones. Aporta mucha densidad a la piel, regenera, consigue un efecto tensor... y produce mucho menos edema que otros inductores, inflama menos. Además, no genera granulomas, si esto ocurre es por una mala praxis, por inyectar demasiado producto en una zona pequeña. A mí me gusta ir poco a poco en los resultados.

¿Cuándo veremos los efectos definitivos?

A partir de la tercera semana comienza a fabricarse colágeno nuevo, pero el resultado definitivo se ve a partir del tercer o cuarto mes.

¿Cuáles son las zonas indicadas?

Yo lo utilizo sobre todo para reposicionar los pómulos y la zona del óvalo facial.

Una vez aplicado el inductor, observa que para un efecto lifting integral, están indicadas las suturas reabsorbibles. ¿Por qué elige las de Ácido Poliláctico (PLA) en lugar de otras?

Sin duda porque logro un potente efecto tensor con pocas unidades gracias a que son bidireccionales, algo impensable con otras, como las de Polidioxanona (PDO), de las que se necesitan entre 30 y 100 unidades. Con 2 o 4 unidades de las PLA suele ser suficiente, así que hay menos agresión y menos molestias para el paciente. Además la inducción de colágeno alrededor de los conos crea un soporte sólido, y no hay migración. La velocidad a la que se degrada el Poliláctico es mucho menor que la de otros materiales de suturas, así que los efectos duran más.



Para más información sobre tratamientos faciales, clínicas y médicos en toda España, consulta la web


miclínicaestética.com



CLÍNICA ESTÉTICA
MOISÉS AMSELEM



Dr. Moisés Amselem

Calle de Antonio Maura, 7

T. 915 21 17 71

www.clinicaacidohialuronicomadrid.es